



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ГАСТРОСКОПИЕЙ



РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Кафедра гастроэнтерологии ФДПО

- Исследование проводится **СТРОГО НАТОЩАК**. Последний прием пищи не позднее чем за 6 часов перед исследованием (леденцы и жевательная резинка в том числе). **ДАННАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ, В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНО НА ДРУГУЮ ДАТУ!**
- Все препараты, которые Вы принимаете постоянно нужно принять за 3 часа до исследования, запив **небольшим** количеством воды.
- Если Вы принимаете препараты влияющие на свертываемость крови (ВАРФАРИН, ДАБИГАТРАН, РИВАРОКСАБАН, ГЕПАРИН, КЛОПИДОГРЕЛЬ, АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА и др.) необходимо накануне проконсультироваться с врачом, назначившим эти средства.
- За 5 дней до процедуры пациенту необходимо избегать приема железосодержащих препаратов, активированного угля, висмут содержащих препаратов.
- Пациентам с эпилепсией исследование проводится **ТОЛЬКО** под седацией!
- Пациентам с сахарным диабетом необходимо записаться на исследование на ЭГДС в утренние часы.
  - **В ночь перед исследованием необходимо ввести половину дозы инсулина, затем должен быть небольшой перекус. Утром перед исследованием НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСУЛИН.** Инсулин необходимо взять с собой на исследование. **Перед тем как отправиться на исследование измерьте уровень глюкозы**, если он слишком низкий, то можно употребить небольшое количество подсахаренной воды или сока без мякоти. После исследования Вы можете вернуться к подобранной для Вас дозировке инсулина.
- Пациентам с бронхиальной астмой необходимо взять с собой ингалятор

